ORIENTAÇÃO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DE OSELTAMIVIR (TAMIFLU) PARA CRIANÇAS (12/5/2010)

A partir de agora, a solução oral (já pronta) será disponibilizada apenas para as crianças menores de 1 ano de idade.

Para CRIANÇAS menores de 1 ano, a dose é calculada de acordo com a idade, conforme tabela abaixo:

IDADE da criança	DOSE do Tamiflu	Freqüência da administração
< 3 meses	12 mg (0,8ml)	Duas vezes ao dia, por 5 dias. Prescrição criteriosa nesta situação.
3 – 5 meses	20 mg (1,3ml)	Duas vezes ao dia, por 5 dias
6 – 11 meses	25 mg (1,6ml)	Duas vezes ao dia, por 5 dias

Isto porque o Ministério da Saúde passou a distribuir o oseltamivir (Tamiflu) em cápsulas de 30mg e 45mg, além da formulação já existente de 75mg. Contudo, para as crianças que não conseguem ingerir a cápsula, recomendam-se os seguintes passos:

1) Verifique se você está usando a dose correta de acordo com a figura e a tabela abaixo.

30mg

45mg

75mg

Dosagem de Oseltamivir (Tamiflu) de acordo com o peso da criança:

PESO da criança	DOSE do Tamiflu	Quantidade de cápsulas
10 a 14 kg	30 mg 2 x/dia	1 cápsula de 30 mg 2 vezes ao dia
15 a 23 kg	45 mg 2 x/dia	1 cápsula de 45 mg 2 vezes ao dia
23 a 40 kg	60 mg 2 x/dia	2 cápsulas de 30 mg 2 vezes ao dia
≥ 40 kg	75 mg 2 x/dia	1 cápsula de 75 mg 2 vezes ao dia

2) Pegue a(s) cápsula(s) e corte a ponta superior com uma tesoura (lembrar que esta deve ser limpa antes do uso).

3) Transfira todo o conteúdo da(s) cápsula(s) para uma colher.

4) Adicione ao pó da cápsula (na colher) uma pequena quantidade de alimento adocicado como leite condensado, calda de chocolate, açúcar mascavo ou refinado dissolvido em água, cobertura de sobremesas, mel (apenas para crianças com dois anos de idade ou mais velhas), calda de frutas ou iogurte (máximo 1 colher de chá), a fim de mascarar o sabor amargo do remédio. Misture bem.

5) Após misturar bem, administre todo o conteúdo da colher para o paciente.

Esta mistura deve ser administrada imediatamente após o preparo.

Repita este procedimento para cada dose que será administrada.