

VACINA CONTRA COVID-19

- Não causa a infecção por COVID-19 e reduz a chance de a pessoa ficar gravemente doente
- Foi desenvolvida seguindo os mesmos requisitos legais de qualidade, segurança e eficácia farmacêutica que outros medicamentos
- Como todos os medicamentos, nenhuma vacina é 100% eficaz e leva algumas semanas para que o corpo esteja protegido



Mesmo depois de vacinado deve-se continuar seguindo as medidas de proteção universal: uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento e não aglomeração!!!



EVENTO ADVERSO PÓS-VACINA (EAPV)

- É qualquer ocorrência clínica indesejada após a vacinação, não possuindo necessariamente relação causal com o uso de uma vacina
- Como todos os medicamentos, a vacina contra COVID-19 pode causar reações em algumas pessoas, mas a maioria deles é leve e de curta duração
- Entrar em contato com a **Central de Teleatendimento 3350-9000** na ocorrência de qualquer sintoma após a vacina ou na presença de sintomas sugestivos de COVID-19, no entanto, caso cidadão procure serviço de saúde presencialmente, o mesmo deve ser atendido normalmente.

EAPV MAIS COMUNS

(Febre, cefaleia, mialgia, dor, rubor e calor no local da aplicação)

- Geralmente iniciam em até 72h da aplicação da vacina
- Se estes sintomas iniciarem após este período, deve-se também considerar outras patologias, como COVID-19 e outras doenças agudas
- Dentre os EAPV tardios (até 30 dias da aplicação da vacina), atenção para os eventos neurológicos e tromboembólicos

EAPV NO LOCAL DA APLICAÇÃO (dor, rubor e calor):

- Realizar compressas frias (NÃO USAR COMPRESSAS QUENTES)
- Não aplicar cremes, pomadas ou qualquer outro produto sobre o local da vacinação
- Não realizar curativos no local de aplicação
- Evitar coçar o local de aplicação
- Lavar o local da aplicação apenas com água e sabão, mantendo-o seco

Outros possíveis EAPVs relatados – ver pg. 2

**CID EAPV
COVID-19**

Y59.0

POSSÍVEIS EVENTOS ADVERSOS RELATADOS

(NOTA: importante profissional de saúde estar atendo para identificar outros sintomas além dos relatados no quadro a seguir)

Severidade	Evento adverso	Orientações / Condutas
LEVE	- Dor, calor, vermelhidão, prurido (coceira), parestesia (formigamento) ou edema no local da aplicação - Astenia, cansaço, fadiga, prostração (mal-estar) - Febre < 38°C, calafrios - Cefaleia ou dor de cabeça leve e autolimitada - Mialgia ou dor muscular - Artralgia ou dor articular ou inchaço articular (localizado) - Náuseas / vômitos / diarreia - Aumento do volume dos linfonodos localizado - Fraqueza muscular localizada (leve e com evolução menor que 48 horas)	- Proceder orientações gerais - Na piora ou persistência dos sintomas >24h ou surgimento de novas manifestações, orientar acionar Central de Teleatendimento (3350-9000)
MODERADO	- Úlcera, ferida, infecção, bolha ou hematoma (>=2cm) no local de aplicação - Urticária ou manchas vermelhas, lesões bolhosas - Coceira ou prurido generalizado - Coceira ocular ou prurido no olho, olhos vermelhos - Lábios inchados ou edema de lábio (localizado) - Vômitos persistentes	- Realizar atendimento médico para confirmar gravidade do quadro - Proceder orientações/conduta conforme achado - Se necessário encaminhamento para Ambulatório EAPV: eSaúde → CBO 225110 médico alergista e imunologista / área de atuação Reação Adversa Vacina COVID - Na piora dos sintomas ou persistência dos sintomas >24h ou surgimento de novas manifestações, orientar acionar Central de Teleatendimento (3350-9000)
INVESTIGAR POSSIBILIDADE DE COVID-19	- Coriza, congestão nasal, tosse, dor de garganta ou odinofagia - Alteração do paladar ou olfato - Rouquidão isolada - Dor abdominal, diarreia - Febre >= 38°C	- Proceder com atendimento conforme preconizado no documento 1. Fluxo geral de Atendimento¹ - Agendar/coletar swab para PCR COVID-19 → agenda do Enfermeiro - “Reação adversa vacina COVID - SWAB” - Realizar atendimento médico para confirmar gravidade do quadro - Proceder orientações/conduta conforme achado - Na piora dos sintomas ou persistência dos sintomas >24h ou surgimento de novas manifestações, orientar acionar Central de Teleatendimento (3350-9000)
GRAVE	- Angioedema (edema de língua, faringe, laringe, etc) - Rouquidão <i>associada à coceira/prurido generalizado ou lábios inchados ou vermelhão/coceira nos olhos</i> - Choque hipovolêmico (palidez, cianose, sudorese, hipotensão) - Choque anafilático - Icterícia (olhos ou pele amarelada) - Sangramento (pele, gengiva, nariz, olho, urina, fezes, etc.), petéquias, hematomas no corpo; - Dispneia (dificuldade para respirar ou falta de ar) - Dor torácica - Alteração do nível de consciência: desmaio, sensação de desmaio, convulsão, sonolência, irritabilidade, choro persistente (>=3h), agitação/confusão mental - Suspeita de Acidente Vascular Cerebral - AVC - Fraqueza muscular agravada ou generalizada (fraqueza muscular importante) - Parestesia ou formigamento <i>associada a fraqueza muscular ou dificuldade para caminhar</i> - Suspeita de Síndrome de Guillain-Barré ou mielite transversa - Suspeita de trombose ou tromboembolismo associados à plaquetopenia – TTS: alerta para os sinais e sintomas de dispneia, dor torácica, edema de membro inferior, dor abdominal persistente, cefaleia intensa e persistente, turvação visual e petéquias em outros locais fora o sítio de aplicação da vacina; A cefaleia é intensa, não habitual, com piora progressiva, piora em decúbito ou ao abaixar a cabeça, que não responde a analgésicos simples e podendo ser acompanhada de turvação visual, náuseas e vômitos, dificuldade de fala, fraqueza, tontura ou convulsões; - Suspeita de Miocardite ou Pericardite	- Coletar swab para PCR COVID-19 - Realizar atendimento médico para confirmar gravidade do quadro - Proceder orientações/conduta conforme achados - Se necessário encaminhamento para Ambulatório EAPV: eSaúde (CBO 225110 médico alergista e imunologista / área de atuação Reação Adversa Vacina COVID) + orientar procura direta ao Pronto Atendimento do Ambulatório de referência conforme encaminhamento ou UPA - Na piora dos sintomas ou persistência dos sintomas >24h ou surgimento de novas manifestações, orientar acionar Central de Teleatendimento (3350-9000)

VACINA REALIZADA EM PONTO FIXO OU DRIVE-THRU

(*se vacina realizada em ILPI ver fluxograma pg. 4)

- Orientar cidadão a aguardar 15' e em caso de aparecimento de algum sintoma, informar imediatamente algum profissional do local onde foi realizada a vacina
- Se sintoma aparecer após ter se ausentado do local, entrar em contato com preferencialmente com Central de Teleatendimento 3350-9000 ou procurar atendimento médico

CENTRAL DE TELEATENDIMENTO

- Proceder conforme gravidade do sintoma – ver Possíveis Eventos Adversos Relatados (pg. 2).
- Realizar registro de EAPV no formulário Registro de Evento Adverso pós-vacina COVID-19¹
- Organizar e distribuir à equipe de digitação os formulários de registro de EAPV
- Controlar a distribuição, digitação no e-SUS Notifica (pg. 4) e retorno dos formulários de EAPV
- **Se necessário avaliação e encaminhamento para ambulatório EAPV**

UBS/UPA

- Proceder conforme gravidade do sintoma – ver Possíveis Eventos Adversos Relatados (pg. 2).
- Registrar atendimento no eSaúde com CID **Y59.0** (Efeitos Adversos de vacinas antivirais), para identificação do caso pelo DS (eSaúde/módulo Vigilância Epidemiológica)
- **Se necessário avaliação e encaminhamento para ambulatório EAPV:**
 - **UBS:** solicitar apoio infectologista NASF
 - **UPA:** solicitar apoio Coordenador Médico

OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (Particular/convênio)

- Realizar atendimento médico, com orientações/conduas conforme achado
- Realizar registro no e-SUS Notifica (pg.4)

ENCAMINHAMENTO PARA AMBULATÓRIO EAPV (HC) realizado pela CENTRAL DE TELEATENDIMENTO, INFECTOLOGISTA NASF E COORDENADOR MÉDICO UPA

- Conforme avaliação e necessidade
- Encaminhamento e-Saúde: CBO 225110 médico alergista e imunologista / área de atuação Reação Adversa Vacina COVID
- Casos graves: encaminhamento via eSaúde + orientar procura direta ao Pronto Atendimento do Ambulatório de referência conforme encaminhamento ou UPA

DISTRITO SANITÁRIO

- Consultar todos os dias e-SUS Notifica para identificar novas notificações de EAPV (registros da Central de Teleatendimento e clínica/consultório particular/privado)
- Consultar e-Saúde, módulo vigilância, EAPV e notificar no e-SUS Notifica os atendimentos realizados em UBS e UPA
- Proceder com investigação de EAPV no e-SUS Notifica

¹Disponível em: <https://saude.curitiba.pr.gov.br/vigilancia/epidemiologica/vigilancia-de-a-a-z/12-vigilancia/1480-material-gr%C3%A1fico.html>

VACINA REALIZADA EM ILPI

ILPI – Instituição de Longa Permanência para Idosos

- Monitorar moradores e trabalhadores após vacina
- Entrar em contato com Distrito Sanitário (DS) na ocorrência de sintomas após vacina
- Continuar monitorando moradores e trabalhadores para aparecimento de sintomas sugestivos de COVID-19 e seguir fluxo estabelecido (ver documento 11. Acompanhamento e Cuidado ao residente e trabalhador de ILPI¹)

DISTRITO SANITÁRIO

- Proceder conforme gravidade do sintoma - ver Possíveis Eventos Adversos Relatados, pg. 2
 - LEVE: orientações
 - MODERADO: marcar consulta com infectologista NASF
 - GRAVE: orientar procurar atendimento médico (pronto atendimento, UPA)
 - SUSPEITA COVID-19: proceder conforme documento 11. Acompanhamento e Cuidado ao residente e trabalhador de ILPI¹
- Realizar registro no e-SUS Notifica
- Proceder com investigação de EAPV no e-SUS Notifica

INFECTOLOGISTA NASF

- Realizar atendimento médico para confirmar severidade do EAPV
- Proceder orientações/condução conforme achado
- Se necessário, realizar encaminhamento conforme necessidade
- Encaminhamento via e-Saúde: CBO 225110 médico alergista e imunologista / área de atuação Reação Adversa Vacina COVID
- CASOS GRAVES: encaminhamento via eSaude + orientar procura direta ao Pronto Atendimento do Ambulatório de referência conforme encaminhamento

¹Disponível em: <https://saude.curitiba.pr.gov.br/vigilancia/epidemiologica/vigilancia-de-a-a-z/12-vigilancia/1480-material-gr%C3%A1fico.html>

*NOTIFICAÇÃO EAPV - Portaria n.º 204, de 17 de fevereiro de 2016

- Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública **nos serviços de saúde públicos e privados** em todo o território nacional
- Obrigatoriedade de notificação IMEDIATA de eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação

e-SUS NOTIFICA:

<https://notifica.saude.gov.br/login>

- Plataforma do MS para registro de EAPV
 - Cada notificador realizar seu próprio cadastro (autocadastro) – botão “Criar acesso”
 - Necessário confirmar cadastro pelo link enviado automaticamente pelo sistema
 - Ao realizar cadastro é importante informação correta do CNES onde o profissional de saúde está vinculado, pois a aprovação é automática após checagem do dado informado com o CNES
- NOTIFICAÇÃO: todos os notificadores com autocadastro aprovado podem realizar a notificação
- INVESTIGAÇÃO: somente DS (gestor municipal)
- ENCERRAMENTO: SESA (gestor estadual)

