



TRATAMENTO ANTIVIRAL COVID – FLUXO NMV/r (NIRMATRELVIR-RITONAVIR ou PAXLOVID®)

20/05/2025

O tratamento com o medicamento NMV/r (Nirmatrelvir associado ao Ritonavir ou PAXLOVID®) será fornecido ao paciente com Covid que cumprir **TODOS** os pré-requisitos abaixo, **independente do status vacinal**.



➤ **AFASTAR CONTRAINDICAÇÕES**

- Pessoas com **idade < 18 anos**
- Pessoas com **peso < 40 kg**
- **Após o 5º dia** do início dos sintomas
- **Gestantes**
- Pacientes hospitalizados devido à necessidade de **suplementação de O2**
- Pacientes com **insuficiência renal grave ou dialítica** (TFG < 30ml/min). Para pacientes com insuficiência renal moderada (TFG ≥30 até <60ml/min), a dose deve ser ajustada*
- Pacientes **insuficiência hepática grave** conhecida ou suspeita de cirrose, com ALT (TGP) > 5x o limite superior da normalidade e insuficiência hepática grave (classe C no escore Child-Pugh)
- Não está liberado para profilaxia pré-exposição nem pós-exposição
- Não está liberado para pacientes assintomáticos

➤ **AFASTAR INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

- O NMV/r interage com diversos medicamentos, sendo alguns de uso impeditivo e outros de uso com precaução [\(ver p.3\)](#)



***Prescrever NMV/r**

Apresentação	Nirmatrelvir 150 mg (comprimido rosa) + Ritonavir 100 mg (comprimido branco)
Dose	2 comprimidos de Nirmatrelvir 150 mg + 1 comprimido de Ritonavir 100 mg *ajustar dose se insuficiência renal moderada (TFG ≥ 30 a < 60mL/min): 1 cp Nirmatrelvir 150 mg + 1 cp Ritonavir 100 mg * Não é necessário ajuste de dose para pessoas vivendo com HIV (PVHIV) que façam uso de Ritonavir
Frequência	2 vezes ao dia (12/12 horas)
Período	5 dias

Não é necessário o formulário para dispensação de NMV/r.

O medicamento é fornecido nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Curitiba para o usuário que:

- Possui cadastro definitivo OU cadastro provisório em Curitiba.
- Apresente prescrição médica (SUS ou NÃO-SUS)
- **Para prescrições NÃO SUS, é necessária a justificativa** (que pode ser na própria prescrição) contendo data de início dos sintomas, sintomas apresentados e data ou laudo do teste positivo para o SARS-CoV-2.
- O medicamento possui lactose e açúcar em sua composição. Verificar risco/benefício para pacientes intolerantes E utilizar com cautela em pacientes diabéticos.

TRATAMENTO ANTIVIRAL COVID – FLUXO NMV/r (NIRMATRELVIR-RITONAVIR ou PAXLOVID®)

20/05/2025

Todo paciente que receber tratamento de NMV/r deve ser reavaliado pelo local de origem da prescrição o mais breve possível, após o final do tratamento.

REAÇÕES ADVERSAS

As reações ao NMV/r são consideradas não graves, sendo as mais frequentes: disgeusia, diarreia, aumento do D-dímero e ALT (TGP), diminuição da depuração renal da creatinina, dor de cabeça, hipertensão arterial, náusea e vômito.

Caso ocorram eventos adversos em decorrência do medicamento, encaminhar para avaliação na UPA Boqueirão.

A notificação de eventos adversos deve ser feita no site <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes/vigimed>

DEFINIÇÃO DE IMUNOCOMPROMETIMENTO, PARA FINS DE USO DO ANTIVIRAL NMV/r (NIRMATRELVIR/RITONAVIR) EM PESSOAS COM COVID E IDADE ≥18 ANOS

- **Imunodeficiência primária grave ou erros inatos da imunidade;**
- **Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH)** em uso de drogas imunossupressoras;
- Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHIV) com **CD4 < 200 céls/mm³** (últimos 6 meses) ou ausência/abandono de tratamento;
- Uso de **corticoides em doses ≥20mg/dia de prednisona**, ou equivalente, por um período ≥14 dias, ou em pulsoterapia com metilprednisolona;
- **Insuficiência renal não dialítica**, com TFG ≥30ml/min;
- **Doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, autoimunes e autoinflamatórias** em tratamento com medicamentos modificadores da resposta imune*;
- Pacientes oncológicos que realizaram **tratamento quimioterápico nos últimos 6 meses**.

*Drogas modificadoras da resposta imune e doses consideradas imunossupressoras

Drogas modificadoras da resposta imune	Doses de imunossupressão
Corticoide: prednisolona ou metilprednisolona	≥20mg/dia por um período ≥14 dias
Metotrexato	≥0,4mg/kg/semana
Leflunomida	0,25 a 0,5mg/kg/dia
Micofenolato de mofetil ou sódico	3g/dia
Ciclofosfamida	0,5 a 2,0mg/kg/dia
Ciclosporina	>2,5mg/kg/dia
Tacrolimo	0,1 a 0,2mg/kg/dia
6-mercaptopurina	1,5mg/kg/dia
Imunobiológicos: infliximabe, etanercepte, adalimumabe, tocilizumabe, canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, secukinumabe, ustekinumabe, rituximabe, belimumabe, ixequizumabe, guselcumabe e vedolizumabe	Qualquer dose é considerada imunossupressora

*Situações de baixo grau de imunossupressão

Drogas modificadoras da resposta imune	Doses de imunossupressão
Corticoide	Doses menores que as definidas para alto grau por mais de 14 dias ou dias alternados
Metotrexato	Doses de 0,4mg/kg/semana
Azatioprina	≤3mg/kg/dia
6-mercaptopurina	≤1,5mg/kg/dia

TRATAMENTO ANTIVIRAL COVID – FLUXO NMV/r (NIRMATRELVIR-RITONAVIR ou PAXLOVID®)

20/05/2025

FÁRMACOS QUE POSSUEM INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA RELEVANTE COM NMV/r

Classes terapêuticas de medicamentos	Não utilizar concomitantemente ao NMV/r	Suspender temporariamente o medicamento concomitante e avaliar risco/benefício do NMV/r	Ajustar a dose do medicamento concomitante e monitorar reações adversas do NMV/r	Continuar medicamento concomitante e monitorar as reações adversas do NMV/r
Agentes anti-infecciosos	Glecaprevir/pibrentasvir Rifampicina Rifapentina	Eritromicina	Claritromicina Itraconazol Cetoconazol Maraviroque Rifabutina	Cobicistate Antiretrovirais combinados com ritonavir Isavuconazol Posaconazol Voriconazol
Agentes cardiovasculares	Amiodarona Clopidogrel Disopiramida Dofetilida Dronedarona Eplerenona Flecainida Ivabradina Propafenona Quinidina	Alisquireno Ranolazina Ticagrelor Vorapaxar	Cilostazol Digoxina Mexiletina	Anlodipino Diltiazem Felodipina Nifedipino Sacubitril Valsartana Verapamil
Agentes modificadores de lipídios	-	Atorvastatina Lomitapida Lovastatina Rosuvastatina Sinvastatina	-	-
Agentes neuropsiquiátricos (antipsicóticos/ neurolépticos)	Clozapina Lumateperona Lurasidona Midazolam oral (e parenteral usado com cautela) Pimozida	Clonazepam Clorazepato Diazepam Estazolam Flurazepam Suvorexanto Triazolam	Alprazolam Aripiprazol Brexpiprazol Bupiriona Cariprazina Clordiazepóxido Clobazam Iloperidona Pimavanserina Quetiapina Trazodona	Haloperidol Hidroxizina Mirtazapina Risperidona Ziprasidona Zolpidem
Analgésicos/ medicamentos para enxaqueca	Petidina	Eletriptano Rimegepant Ubrogepant	Fentanil Hidrocodona Oxicodona	Buprenorfina Hidromorfona Metadona Morfina Tramadol
Anticoagulantes	-	Rivaroxabana	Apixabana Dabigatrana Edoxabana	Varfarina
Anticonvulsivantes	Carbamazepina Fenobarbital Fenitoina Primidona	-	-	-
Hipoglicemiantes orais	-	-	Saxagliptina	Glibenclamida Gliburida Glibencilamida
Imunossupressores	Voclosporina	Everolimo Sirolimo Tacrolimo	Ciclosporina	-


Continua na p.4

TRATAMENTO ANTIVIRAL COVID – FLUXO NMV/r (NIRMATRELVIR-RITONAVIR ou PAXLOVID®)

20/05/2025

FÁRMACOS QUE POSSUEM INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA RELEVANTE COM NMV/r

Classes terapêuticas de medicamentos	Não utilizar concomitantemente ao NMV/r	Suspender temporariamente o medicamento concomitante e avaliar risco/benefício do NMV/r	Ajustar a dose do medicamento concomitante e monitorar reações adversas do NMV/r	Continuar medicamento concomitante e monitorar as reações adversas do NMV/r
Medicamentos para hipertensão pulmonar*/respiratórios/ Medicamentos para disfunção erétil**	Sildenafil* Tadalafila* Vardenafila*	Avanafila Salmeterol	Sildenafil** Tadalafila** Vardenafila** Riociguate	-
Medicamentos para Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)	-	Alfuzosina Silodosina	Tansulosina	Doxazosina Terazosina
Variadas (medicamentos de diferentes classes terapêuticas)	Bosentana Agentes anticancer Derivados de ergot (dihidroergotamina, ergonovina, ergotamina, metilergonovina) Lumacaftor/ivacaftor Erva de Sao Joao (Hypericum perforatum) Tolvaptano	Agentes anticancer Colchicina Finerenona Flibanserina Naloxegol	Agentes anticancer Darifenacina Elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor Eluxadolina Ivacaftor Tezacaftor/ivacaftor	-



Voltar